嘔吐物や排泄物の安全な処理に

かんたん汚物処理セット

第三者試験機関の効果試験で確かな効果が証明された「ノロハンター®」液剤を使用し、作業者の感染リスクを低減させ、安全で簡単に汚物処理ができる「かんたん汚物処理セット」のご案内です。

5回分セット

■「かんたん汚物処理セット」を使った、効率的な嘔吐物処理
※注意：作業前に、【指輪、腕時計】等は、外してください。

◎セット内容 【5回分】

- ノロハンター®ハンドスプレー 500ml × 1 本
- 使い捨てサージカルマスク × 10 枚
- 使い捨てビニール手袋 × 10 組
- 取っ手付きゴミ袋 × 10 袋
- 安全処理マニュアル × 1 部

200ml 増量

※通常 300ml を 500ml へ増量




◎その他準備するもの

- バケツ（容量 10L 程度） × 1 個
- 新聞紙、トイレットペーパー等 × 適宜

●ノロハンター® 液剤の効果試験データ

試験ウイルス ： ネコカリシウイルス F−9株
製品名 ： フラッシュキラー、ノロハンター、ストロングバスター

二酸化塩素化合物を主成分とした除菌、消毒剤のネコカリシウイルスに対する抗ウイルス効果

NPO法人　バイオメディカルサイエンス研究会

目的 ： 二酸化塩素化合物を主成分とした除菌、消毒剤のネコカリシウイルスに対する効果を調べる。

試験材料
1）ウイルス：ネコカリシウイルス F−9株
2）被験資料：二酸化塩素化合物：HH-P-211106

試験方法
ウイルスと被験資料を1：9の割合で混合し、0分、30秒、5分後に混合液を採取してプラーク試験に供した。反応の停止には1%チオ硫酸Naを50μLを使用した。プラーク試験は定法によった。

結果
下表の結果を得た。

		ウイルス量（0．1mL）	備考
0分	対照	10^{7}	
	試験品	9.3×10^{6}	
30秒	対照	1.05×10^{7}	
	試験品	1.03×10^{4}	1/1000以下
5分	対照	1.09×10^{7}	
	試験品	＜10	検出限界以下

被験剤はネコカリシウイルスを30秒処理で1/1000に5分処理で検出限界以下に不活化した。

※30 秒後に 1/1000、5 分後には検出限界以下
※ノロハンター® は、ノロウイルスに対しての優れた除菌効果が証明されています。

■汚物処理手順

◎作業前におこなう準備

- バケツにゴミ袋をセットします。※図 1
- マスク、ビニール手袋を装着します。
- ノロハンター®液剤のストッパーを解除します。※図 2

図 1

図 2

※このストッパーを 90° 曲げてください。

①汚物全体へ液剤を十分に噴霧します。※約 60 秒程度

⇒

②新聞紙やペーパーで汚物全体を覆い被せてください。

⇒

③ノロハンター液剤を十分に湿る程度噴霧してください。

⇒

④厚紙やチリトリ等で覆ったペーパーごと回収してください。

⇒

⑤汚物を取り去った後の床面に液剤を十分に噴霧します。

⇒

⑥ペーパーを使って床面を丁寧に拭きあげてください。

⑦キレイ拭きあげた床面全体に再度液剤を十分に噴霧します。

※液剤は、拭き取らないでください。

⇒

⑧汚物や使用した手袋などもすべてバケツに入れます。

⇒

⑨液剤をゴミ袋の中へ十分に噴霧して、袋を閉じてください。

◎重要なポイント◎
ノロハンター® 液剤を、作業する室内空間全体に噴霧してください。
ノロハンター® 液剤は、接触分解で分解不活性化をおこないます。
噴霧後は約 60 秒以上、そのままの状態で待ってください。

■製造販売元

住環境テクノロジージャパン株式会社
千葉県船橋市北本町 1-17-25 ベンチャープラザ船橋 105
電話 047(460)2188　Mail: info@jyukankyo.jp

Copyright (C) Jyukankyo Technology Japan Co.,ltd. All Rights Reserved